

Попутные встречи китообразных в западной части
Берингова моря в 2019–2020 гг.

Opportunistic cetacean encounters in the western
Bering Sea in 2019–2020.



Белонович О.А.(1), Миронова А.М.(2), Титова О.В.(3).
Belonovich O.A.(1), Mironova A.M.(2), Titova O.V.(3).

1. ФГБУ "Государственный природный биосферный заповедник "Командорский" имени С.В. Маракова, Никольское, Камчатский край.
2. Камчатский филиал ВНИРО «КамчатНИРО», Петропавловск-Камчатский.
3. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева, Москва.

Методы


Methods

Судно Vessel	Маршрут Route	Даты Dates
Ярусолов 1 Longline 1	Вышло из Петропавловска-Камчатского и вело промысел в районе Карагинского и Олюторского заливов. Fishing in Karaginsky and Olutorsky Gulf.	Март-апрель 2019 March-April 2019
Ярусолов 2 Longline 2	Вышло из Петропавловска-Камчатского и вело промысел в районе Карагинского и Олюторского заливов. Fishing in Karaginsky and Olutorsky Gulf.	Март-апрель 2020 March-April 2020
Ярусолов 2 Longline 3	На промысле у Корякского побережья и мыса Наварин и в начале августа ушло в г. Петропавловск-Камчатский. Fishing off Koryak coast and Navarin cape.	Май-август 2020 May-August 2020
Туристическое Recreational boat	Шло по маршруту г. Петропавловск-Камчатский- г. Анадырь-о-в Врангеля- г. Анадырь- г.Петропавловск-Камчатский. Sailing from Petropavlovsk-K.- Wrangel Isl.- Anadyr- Petropavlovsk-K.	Август-Октябрь 2019 August-October 2019



Результаты

Results



Выводы

Conclusions

- * В летнее и осеннее время западная часть Берингова моря от Корякского побережья интенсивно используется серыми и горбатыми китами.
- * Косатки, в данном исследовании, наблюдались лишь с ярусоловов, при этом в 70% случаев появление косаток было ассоциировано с выборкой порядков на черного палтуса.
- * Акватория Олюторского залива, возможно, является важным районом обитания финвалов в зимнее время.
- * Наблюдения за морскими млекопитающими, проводимые попутно с другой работой, позволяют собрать ценные данные по встречаемости, видовому составу и сезонности распределения различных видов китообразных на обширной акватории.

- * The Western Bering Sea was intensively used by gray and humpback whales during summer and autumn months.
- * In this study, killer whales were observed only from longline fishing vessels and 70% of time their appearance were associated with the Greenland turbot hauling.
- * Olyutorsky Bay possibly is an important habitat for fin whales during winter time.
- * Opportunistic observations combined with the other work allow to collect valuable data on the occurrence, species composition and distribution of cetacean species over a vast area .